

Rediar

Produktový list

Proč telata profitují používáním Farm-O-San Rediar?

Různé formy průjmových onemocnění jsou hlavní hrozbou v prvních týdnech života telat. Jsou také hlavní příčinou, která vede k dehydrataci a snížení růstu. Základem správné výživy je dostatečný příjem kolostru. Ustájení, hygiena a další faktory managementu jako např. příprava a kvalita mléčné náhražky, teplota podávaného mléka či umístění kbelíku jsou také velmi důležité.

Farm-O-San Rediar je dietetické krmivo pro telata, vyvinuté ke stabilizaci vodní a elektrolytické bilance a podporující fyziologické zažívání v případě průjmů. Farm-O-San Rediar se ve střevě telete formuje v gel a obsahuje probiotika, která podporují bakteriální rovnováhu ve střevě.

Obecné informace

Typ krmiva:	dietetické doplňkové krmivo pro telata do odstavu
Balení:	krabice obsahující 10 kusů 100 gramových sáčků nebo kyblík o obsahu 3,5 kg
Doba použití:	12 měsíců
Skladovací podmínky:	skladujte na chladném, tmavém a suchém místě v uzavřeném obalu

Dávkování a návod k použití

Viz návod na etiketě produktu pro správné použití produktu.

Používejte Farm-O-San Rediar v případě digestivních poruch (průjmů) u mladých telat až do věku 6 měsíců. Doporučená aplikace: Při prvních příznacích mírných zažívacích poruch: pokračujte ve zkrmování mléka (nebo mléčné náhražky) jako obvykle a přidejte k němu 25 gramů Rediaru na litr mléka či (mléčné náhražky). Alternativně připravte roztok Rediaru smícháním 50 g Rediaru (jedna odměrka je 100 g) na 1 litr vody (40° C) a nabízejte roztok Rediaru mezi krmením mlékem. Aplikujte maximálně po dobu 3 dnů. V případě závažnějších digestivních potíží: vynechte jedno či dvě krmení mlékem (mléčnou náhražkou) a podávejte místo něj roztok Rediaru ad libitum. Postupně opět zaveďte krmení mlékem (mléčnou náhražkou) s 1,5–2 litry mléka (mléčné náhražky) 3 x denně a přidávejte 25 g Rediaru na 1 litr mléka. Alternativa: postupně vraťte mléko (mléčnou náhražku) krmením 1,5–2 litry mléka (mléčné náhražky) 3 x denně, a k tomu podávejte 1 až 2 litry roztoku Rediaru. Podávejte roztok 3 x denně mezi krmením mlékem (mléčnou náhražkou) v periodě 2–3 dnů. Pokud je Rediar přidáván do mléka (mléčné náhražky), telata by měla mít volný přístup k pitné vodě.

Složení		na litr produktu	
Dextróza, fruktóza, laktóza	45 %	Vitamin E	2 130 m.j.
Chlorid sodný	7,2 %	Mangan	138 mg
Soda bikarbonát	5,6 %	Zinek	165 mg
Propionát sodný	2,9 %	Měď	8 mg
Vitamin A	40 000 m.j.	Bakteriální kultury	4 x 10 ¹⁰ CFU
Vitamin D ₃	2 540 m.j.		

